



ANTIBACTERIAL DRESSING

MEDIHONEY®

with Active *Leptospermum* Honey

Ιατρικό Αντιβακτηριακό
Μέλι σε Σωληνάριο



**Το καλύτερο ιατρικό μέλι
για τις θεραπευτικές του ιδιότητες**

- Ισχυρή αντιμικροβιακή δράση
- Σημαντικά ταχύτερη επούλωση
- Εκπληκτική αναπλαστική ικανότητα
- Αντιφλεγμονώδη δράση
- Μοναδική ενυδάτωση
- Ισχυρά οσμωτικό



Αποτελεσματικό
με βακτήρια,
μύκητες & ιούς,
μικρόβια ανθεκτικά
σε αντιβίωση

Ισχυρά
αντιβακτηριακό
(gram (-) & gram (+)).
Θεραπεία σε ισχυρά
παθογόνους
μικροοργανισμούς
όπως MRSA, Pseudomonas,
Candida, Proteus,
Helicobacter pylori
(H. pylori)

Μέλι και άνθρωπος, μια σχέση εμπιστοσύνης

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του μελιού είναι γνωστές στην ανθρωπότητα από την Αρχαία Ελλάδα και την Αίγυπτο εδώ και **4000 χρόνια**. Ο πάπυρος του Edwin Smith αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα στη ιστορία της ιατρικής πράξης, καθώς παρουσιάζει έναν χειρουργικό οδηγό στην θεραπεία τραύματος με μέλι και χρονολογείται τον 17 αιώνα π.Χ.

Μέχρι και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το μέλι υπήρξε **ο καλύτερος σύμμαχός μας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τραυμάτων αλλά και αρκετών παθήσεων**. Από το 1940 και έπειτα όμως, όταν άρχισαν δηλαδή να κυκλοφορούν τα πρώτα αντιβιοτικά, το μέλι έγινε λιγότερο δημοφιλές και για πάρα πολλά χρόνια παρέμεινε απλώς σαν ένα «ιατροσόφι» μοναχών.


Μόλις μισό αιώνα μετά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει πλέον σήμα κινδύνου από την εμφάνιση ολοένα και περισσότερο ανθεκτικών μικροβίων, αποτέλεσμα αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών. Το ενδιαφέρον στρέφεται και πάλι στο μέλι.

Με την πρόοδο της τεχνολογίας τα τελευταία δέκα χρόνια, το μέλι γίνεται ιατρικό, είναι ασφαλές και ανακτά πλέον την αξία του στην σύγχρονη ιατρική, θεραπεύοντας χιλιάδες ανθρώπους στον κόσμο.



εγκεκριμένο από **FDA**


Επιφάνεια πληγής
με νεκρωτικό ιστό
και αυξημένο pH



Δέρμα


Υποδόριος
Ιστός

Επίστρωση
ANTIBACTERIAL DRESSING
MEDIHONEY®
with Active Leptospermum Honey



Δρα
οσμωτικά
μειώνοντας το οίδημα
& επαναφέρει το pH,
ένας πολύ σημαντικός
παράγοντας
σε δύσκολα τραύματα


- Αυξάνει την αιμάτωση, απελευθερώνει οξυγόνο.
- Το μέλι της MediHoney έχει μοναδικά συστατικά και μηχανισμούς που του επιτρέπουν να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση.



- Ισχυρά οσμωτικό

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

Χαμηλά επίπεδα pH



Ο μη βιώσιμος ιστός αφαιρείται.

+12 UMF

>355mg/kg
MGO

Προκαλεί
ανοσοδιέγερση,
ενισχύοντας την
φυσική άμυνα
και την
επούλωση
των ιστών

TNF-α
IL-6, IL-1b
cytokines
collagen

Παρέχει
το κατάλληλο
υγρό περιβάλλον
για τη δημιουργία
νέου ιστού.

Εξουδετερώνει δυσοσμίες,
προάγει την καλή υγιεινή,
θρέφει & προστατεύει
το δέρμα



Medihoney 100%

Ιατρικό Αντιβακτηριακό Μέλι



Ιδανικό για:

- Βαθιά τραύματα και κοιλότητες κόλπων
- Μολυσμένα και δύσοσμα τραύματα
- Νεκρωτικά και sloughy τραύματα
- Χειρουργικά και μετά-χειρουργικά τραύματα
- Μοσχεύματα σε δότριες και λήπτριες επιφάνειες
- Έλκη ποδιών (φλεβικά, αρτηριακά και μικτά έλκη) και διαβητικά έλκη ποδιών
- 1ου και 2ου βαθμού εγκαύματα

Ιατρικό Αντιβακτηριακό ενεργό "great Leptospermum Manuka" μέλι 100%, του οίκου **Integra Lifesciences** σε ατομικό σφραγισμένο επαναχρησιμοποιήσιμο σωληνάριο.

Χαρακτηριστικά

- Ένα εντελώς φυσικό προϊόν το οποίο είναι 100% καθαρό ιατρικό μέλι Manuka.
- Παρέχει αντιμικροβιακή δράση ευρέως φάσματος και είναι αποτελεσματικό κατά του βιοφίλμ λόγω ότι η περιεκτικότητα σε MgO είναι πάνω από 355 mg/Kg.
- Είναι αντιφλεγμονώδες.
- Εξαλείφει δυσοσμίες, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των ασθενών.
- Παρέχει αυτολυτικό καθαρισμό μέσω της ωσμωτικής δράσης, αφαιρώντας αποτελεσματικά το νεκρωτικό ιστό και το Slough του τραύματος.
- Ρυθμίζει το pH του τραύματος σε εύρος 3-4 δημιουργώντας ιδανικότερο περιβάλλον για την επούλωση των τραυμάτων.
- Είναι ασφαλές να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένης της παιδιατρικής και των νεογνών.
- Το σωληνάριο σφραγίζεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέχρι και 4 μήνες από το άνοιγμα.
- Εκτεταμένες κλινικές αποδείξεις σε μια μεγάλη ποικιλία τύπων τραυμάτων και δερματικών παθήσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ / ΚΟΥΤΙ
398	20gr	5
405	50gr	1

Medihoney Wound gel Ιατρικό Αντιβακτηριακό Μέλι με Κερί

Ιατρικό Αντιβακτηριακό ενεργό "great Leptospermum Manuka" μέλι 80%, με κερί του οίκου **Integra Lifesciences** σε ατομικό σφραγισμένο επαναχρησιμο-ποιήσιμο σωληνάριο.

Χαρακτηριστικά

- Έχουν αποδειχθεί κλινικά αποτελεσματικότερα για: Να δημιουργήσουν ένα αντιβακτηριδιακό περιβάλλον που είναι αποτελεσματικό έναντι ενός ευρέος φάσματος βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένων και των ανθεκτικών οργανισμών σε αντιβιοτικά.
- Γρήγορος, αποτελεσματικός αυτολυτικός καθαρισμός του Slough και του νεκρωτικού ιστού σε ένα αντιβακτηριακό περιβάλλον.
- Ταχύτατη απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών.
- Παρέχει ένα υγρό περιβάλλον επούλωσης τραυμάτων μειώνοντας έτσι τον τραυματισμό και τον πόνο στην αλλαγή του επιθέματος.
- Το Medihoney Antibacterial Wound Gel™ έχει ειδικά σχεδιαστεί συνδυάζοντας 80% Medihoney® αντιβακτηριακό μέλι μαζί με κερί για να παρέχει μια υψηλά κολλώδης γέλη η οποία είναι εύκολη στην εφαρμογή και με πολύ καλά χαρακτηριστικά καθαρισμού της όταν αλλάζουμε τα επιθέματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ / ΚΟΥΤΙ
391	10gr	20
395	20gr	5

Ιδανικό για:

- Χειρουργικά τραύματα
- Οξεία και χρόνια τραύματα
- Εγκαύματα
- Έλκη κάτω άκρων
- Πιεστικά έλκη
- Μόσχευμα σε δότεριες και λήπτριες επιφάνειες

Medihoney Barrier cream

Ιατρικό Αντιβακτηριακό Μέλι Φραγμού



Κατάλληλο για:

- Υγρούς χώρους: Σκασμένα, Ξηρά χέρια από συχνό πλύσιμο χεριών
- Ερεθισμούς, Γδαρσίματα, Κοκκινίλες
- Σύγκαμα, Εξάνθημα πάνας που συνδέονται με δερματίτιδα από ούρα
- Τραυματισμένο δέρμα
- Περιτραυματική επιφάνεια, Πληγή, Κόκκινες μύτες από συνάχι κατά τη διάρκεια ενός κρυολογήματος ή αλλεργική ρινίτιδα,
- Παρατεταμένη χρήση σε μεγάλες περιοχές του δέρματος, βρέφη, παιδιά και ηλικιωμένους

Ιατρικό Αντιβακτηριακό ενεργό "great Leptospermum Manuka" μέλι 30%, με λάδι καρύδας, εκχύλισμα λουλουδιού γερμανικού χαμομηλιού, έλαιο νυχτολούλουδου, Aloe Vera, Βιταμίνη Ε, Dimethicone και Trimethylsiloxysilicate (Φράγμα υγρασίας), του οίκου **Integra Lifesciences**, σε ατομικό σφραγισμένο επαναχρησιμοποιήσιμο σωληνάριο.

Χαρακτηριστικά

- Μπορεί να εφαρμοστεί σε υγιή και σε δέρμα που υπάρχει πρόβλημα για την παροχή προστασίας από τα υγρά του σώματος και την υγρασία.
- Μπορεί να εφαρμοστεί γύρω από τα τραύματα και κάτω από τις πτυχές του δέρματος, τα επιθέματα και τις πάνες ακράτειας, όπου ένα προστατευτικό φράγμα θα βοηθήσει στην πρόληψη της βλάβης του δέρματος.
- Προστατεύει το δέρμα που βρίσκεται σε κίνδυνο από την καταστροφή που συνδέεται με την ακράτεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από πάνες ακράτειας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γύρω από τις ακμές του τραύματος για να προστατεύσει το δέρμα από ερεθισμό ή φθορά που προκαλείται από τις εκκρίσεις του τραύματος.
- Βοηθά στην προστασία του δέρματος από τις βλάβες που προκαλούνται από τριβή ή διάτμηση.
- Βοηθά στην πρόληψη καταστροφής.
- Βοηθά στην πρόληψη εκδοράς.
- Βοηθά στη διατήρηση του pH του δέρματος.
- Βοηθά στην πρόληψη «σκασίματος» του δέρματος που προκαλείται από το συχνό πλύσιμο των χεριών.
- Αν το δέρμα φαίνεται λευκό, έχετε εφαρμόσει πάρα πολύ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ / ΚΟΥΤΙ
800	2gr	20
582	50gr	1


Medihoney Derma cream Ιατρικό Αντιβακτηριακό Μέλι Δέρματος

Ιατρικό Αντιβακτηριακό ενεργό "Great Leptospermum Manuka" μέλι 30%, με λάδι καρύδας, εκχύλισμα λουλουδιού γερμανικού χαμομηλιού, έλαιο νυχτολούλουδου, Aloe Vera και Βιταμίνη Ε, του οίκου **Integra Lifesciences** σε ατομικό σφραγισμένο επαναχρησιμοποιήσιμο σωληνάριο.

Χαρακτηριστικά

Κατάλληλο για:

- Ξηρές περιοχές
- Ξηρό, και με φαγούρα δέρμα
- Δέρμα επιρρεπές σε έκζεμα ή δερματίτιδα
- Τραυματισμένο δέρμα
- Πληγές ανεμοβλογιάς που έχουν κρούστα πάνω
- Ξηρές εσχάρες
- Κατάλληλη για παρατεταμένη χρήση σε μεγάλες περιοχές του δέρματος.
- Ευαίσθητες περιοχές όπως το πρόσωπο και τα παιδιά. Εφαρμόστε σε καθαρό, στεγνό δέρμα τρεις φορές την ημέρα ή όπως απαιτείται. Εφαρμόστε ξανά μετά το μπάνιο ή σε κάθε αλλαγή επιθέματος.
- Κατάλληλο για χρήση σε παιδιά.
- Αν το δέρμα φαίνεται λευκό, έχετε εφαρμόσει πάρα πολύ.



Ενδείξεις

- Προστατεύει το ευάλωτο δέρμα από το «σκάσιμο».

Βοηθά:

- Στη διατήρηση των ιδιοτήτων του δέρματος και τη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος.
- Στην προστασία του δέρματος από ερεθισμούς ή βλάβη που προκαλείται από την ξηρότητα, την τριβή ή τη διάτμηση.
- Στη διατήρηση του pH του δέρματος και στην πρόληψη θυλακίτιδας.
- Στη μείωση της φαγούρας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ / ΚΟΥΤΙ
597	50gr	1

Πιεστικό έλκος

Nancy Chaiken, ANP-C, CWOCN Swedish Covenant Hospital, Chicago, IL



Γυναίκα 56 ετών με πιεστικό έλκος στο κόκκυγα Στάδιο IV διαστάσεων 8,0 x 10,0 cm. Μέτρια ποσότητα εξιδρώματος. Περιτραυματικό Ερύθημα και προσκολλημένος, χαλαρός, νεκρωτικός ποιώδης ιστός γύρω από τη βάση του τραύματος. Βαθμολογία πόνου ασθενούς 10/10.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 Εφαρμόστηκε MediHoney 100% και καλύφθηκε με απορροφητικό κάλυμμα αλγινικού ασβεστίου καθημερινά.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9 Ελάχιστη χειρουργική απομάκρυνση πραγματοποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες και το MediHoney 100% που καλύπτεται με επίθεμα αλγινικού ασβεστίου συνέχισε να εφαρμόζεται. Το τραύμα μετρήθηκε 6,0 x 8,0 x 1,0 cm. Ο υγιής ιστός κοκκοποίησης ήταν εμφανής με μικρή ποσότητα περιτονίας εκτεθειμένη. Η αυτοαναφορά των βαθμολογιών πόνου σταδιακά βελτιώθηκε.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16 Επιτεύχθηκε κλείσιμο του τραύματος.

Αρτηριακό έλκος ποδός με ρευματοαρθρίτιδα

Jennifer A. Gardner PT, DPT, MHA, CWS & Tara Murphy RN, BSN Underwood-Memorial Hospital, Woodbury, NJ



Γυναίκα 88 ετών με τραυματικό έλκος στο πρόσθιο κάτω πόδι που περιπλέκεται από φλεβική ανεπάρκεια. Η ασθενής είχε πολλαπλές συννοσηρότητες, όπως ο καρκίνος και η ταυτόχρονη υποβλήθησα θεραπεία ακτινοβολίας. Ξεκίνησε MediHoney wound Gel σε συνδυασμό με ελαστικό σωληνοειδές επίδεσμο. Το τραύμα ήρθε σε πλήρη κλείσιμο σε περίοδο δύο εβδομάδων.

ΗΜΕΡΑ 1 2.5 x 2.5 cm.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 Το τραύμα έκλεισε.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2 Επίσκεψη παρακολούθησης, το τραύμα παραμένει κλειστό (υγιές).

Aaron Wodash RN, WCC Augustana Care Center, Minneapolis, Minnesota

Πιεστικό έλκος σταδίου IV

79χρονη γυναίκα με πιεστικό έλκος σταδίου IV στο αριστερό ισχιακό κύρτωμα. Χρησιμοποιήθηκαν ενζυματικά "καθαριστικά" και συσκευή Αρνητικής Πίεσης (NPWT), αλλά η επούλωση του τραύματος δεν προχώρησε. Επιθέμα MediHoney® Calcium Alginate ξεκίνησε την Ημέρα 0. Το τραύμα επουλώθηκε σε λιγότερο από 9 εβδομάδες.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 4,0 cm x 2,0 cm.

ΜΗΝΑΣ 2 Κλειστό τραύμα.



Nancy Chaiken, ANP-C, CWOON Swedish Covenant Hospital, Chicago, IL

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Ανδρας 53 ετών με ιστορία σε RA (ΡευματοΑρθρίτιδα) παθολογική παχυσαρκία, τραυματισμό του μυοκαρδίου, ηπατίτιδα C και πρόσφατα διαγνωσμένο καρκίνο του οισοφάγου. Έλκος ποδός, MRSA Θετικό 2½ χρόνια διάρκειας. 8,0 x 8,0 x 1,0 cm ολικού πάχους έλκος. Μεγάλες ποσότητες σοβαρού εξιδρώντος, νεκρωτικούς ιστούς με Slough, περιτραυματικό ερύθημα και πόνος.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 Εφαρμόστηκε MediHoney 100% και καλύφθηκε με ασφάλεια με έναν συμμορφούμενο επίδεσμο γάζας καθημερινά.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 Η εφαρμογή του MediHoney 100% συνεχίστηκε. Το τραύμα μετρήθηκε 7,0 x 7,0 x 1.0. Υπήρξε μείωση εξιδρωμάτων, νεκρωτικού Slough, περιτραυματικού ερυθηματος και πόνου του ασθενούς καθώς και αύξηση του ιστού κοκκοποίησης.

ΜΗΝΑΣ 4 Πλήρης κλείσιμο που επιτυγχάνεται παρά τη συνεχή χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του οισοφάγου.



Άκρα σε κίνδυνο

Paul Liguori, MD & Kim Peters, RN, CWS Whittier Rehabilitation Hospital, Bradford, MA



72 ετών διαβητική, νευροπαθητική γυναίκα με κοκκινωπή περιοχή στην ραχιαία επιφάνεια του ποδιού παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο και διαγνώστηκε με κυτταρίτιδα. Τραυματική επιφάνεια καλυμμένη με παχύρρευστο slough περιτραυματικό Οίδημα, ερύθημα και υψηλή θερμοκρασία.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν Επιθέματα MediHoney® Calcium Alginate με ένα απορροφητικό επίθεμα να αλλάζει καθημερινά.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9 Η συχνότητα χρήσης του αλγινικού ασβεστίου MediHoney μειώθηκε σε 1x ημερησίως. Το τραύμα ήταν καθαρό και υπήρχε υπονόμευση. Συσκευή Αρνητικής Πίεσης (NPWT) ξεκίνησε για να ενισχύσει την ανάπτυξη κοκκιοποίησης.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 16 Το άκρο που κινδυνεύει πέτυχε το βέλτιστο

IV Διηθητικό Τραύμα

Roxana Reyna RNC, WWC Driscoll Children's Hospital, Corpus Christi, TX



Άρρεν ηλικίας 4 εβδομάδων με ιστορικό αποτυχίας ευημερίας, διήθηση IV και κυτταρίτιδα στο αριστερό πόδι, το οποίο είχε υποβληθεί σε θεραπεία για 7 ημέρες με αντιβιοτική αλοιφή και καλυμμένο με αντικολλητική γάζα BID. Κατά την έναρξη της θεραπείας MediHoney, οι επίδεσμοι άλλαζαν κάθε 3 ημέρες μέχρι την αλλαγή και στη συνέχεια κάθε 5 ημέρες μέχρι να κλείσουν.

ΗΜΕΡΑ 1 Αρχική αξιολόγηση.

ΗΜΕΡΑ 4 24 ώρες μετά την εφαρμογή MediHoney Paste.

ΜΗΝΑΣ 2 Κλείσιμο τραύματος.

Steven J. Kavros, DPM Gondavascular Wound Healing Center, Mayo Clinic, Ρότσεστερ, MN

Διαβητικό έλκος ποδός

Ανδρας 68 ετών με διαβήτη, περιφερική νευροπάθεια, ESRD και CCLI. Τραύμα που βρίσκεται στην πελματιαία όψη του μπροστινού ποδιού χωρίς έκθεση στα οστά. Αρχικά υπήρχαν πυκνοί ινώδεις ιστοί, slough και περιορισμένη κοκκιοποίηση. Εβδομαδιαίος χειρουργικός καθαρισμός και πρόσθετες συμπληρωματικές θεραπείες συνεχίστηκαν στο πρωτόκολλο περιθαλψής έλκους του ασθενούς.

ΗΜΕΡΑ 1 Επίθεμα MediHoney Calgin Alginate εφαρμόστηκε και αλλαγή κάθε δεύτερη μέρα

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 Ο ασθενής ανταποκρίθηκε καλά με αλλαγές στο επίθεμα κάθε δεύτερη μέρα. Το τραύμα μειώθηκε σε όγκο κατά 25%.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8 Μείωση του τραύματος σε όγκο κατά 85%.



Scott Moore, NREMT-P, RN. Certified ACLS, PALS, BLS ONS Chemotherapy and Biotherapy, Edmund Oncology Center, Edmond, OK

Μετεγχειρητικό τραύμα σε ασθενή που υποβάλλεται σε ακτινοβολία.

Ταχέως αναπτυσσόμενο καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων της δεξιάς μετα-ωτικής περιοχής. Υπερβολική δυσσομία και εξίδρωμα. Ασθενής υπό ακτινοθεραπεία (IMRT).

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 Εφαρμογή εξωτερικού απορροφητικού επιθέματος.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3 Εφαρμογή του MediHoney Calcium Alginate.


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 Εφαρμόστηκαν MediHoney Calcium Alginate με σούπερ απορροφητικό επίθεμα. Το IMRT είχε ως αποτέλεσμα την εξάντληση των νεκρωτικών ιστών. Η περίσσεια του εξιδρώματος γίνεται με συχνές αλλαγές του επίθεμα του τραύματος (1-2 x ημερησίως). Η δυσσομία εξαλείφθηκε.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8 Πλήρης κλείσιμο τραύματος με ελάχιστο ουλώδες ιστό.



Πιεστικό έλκος κόκκυγα

Cecilia Gray, RN, MSN, CNS, CWON & Fatima Ishii, RN, BS, CWON County Los Angeles and University of Southern California Medical Center, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια



Άνδρας 51 ετών παραπληγικός με χρόνια έλκη και ισχιακά πιεστικά έλκη που είχαν προηγουμένως αντιμετωπιστεί με χειρουργικά μυϊκά Flaps. Ιστορικό οστεομυελίτιδας, χρόνια λήψη αντιβιοτικά.11

ΗΜΕΡΑ 0 Πιεστικό Έλκος κόκκυγα 10,0 x 12,0 x 5,0 cm.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2 Εφαρμόστηκε Medihoney κάθε 3 ημέρες, το τραύμα εμφανίζει 100% ιστό κοκκοποίησης.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10 Έξι εβδομάδες πριν, το πιεστικό έλκος κόκκυγα είχε μειωθεί σε ένα ερυθρό τραύμα κοκκοποίησης 1,0 cm x 1,0 cm, το οποίο διαχειρίστηκε με αφρώδες επίθεμα. Είπε στους ιατρούς του ότι είχε κοιμηθεί και έμεινε στην αναπηρική καρέκλα του για 3 συνεχείς εβδομάδες χωρίς αποφόρτηση ή επανατοποθέτηση. Κατά την εκκένωση στη φροντίδα του νοσοκομείου, το τραύμα μετρήθηκε 5,0 x 8,0 x 1,0 cm με 2,5 cm υπονόμηση από τις 9:00 έως τις 12:00 και 100% κοκκοποίησης ιστού μετά από 21 αλλαγές επιθεμάτων.

Μετεγχειρητικά τραύματα σε τοποθεσία PIN

Michael S. Kerzner, DPM, Dept. of Orthopedic Surgery, Duke University Medical Center, Durham, NC.



Μελέτη προοπτικής 19 ασθενών με στόχο την επίδειξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας μιας νέας μεθόδου φροντίδας στην περιοχή τοποθεσίας pin, χρησιμοποιώντας Lenfospermum Honey (LH) Fenestrated επίθεμα - Medihoney® HCS. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε διόρθωση παραμόρφωσης με ανοιχτή μείωση με εξωτερική στερέωση (OREF).

Η ημιδιαφανής φύση του επιθέματος επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης των τραυμάτων χωρίς να πειράξουμε το τραύμα. Τα επιθέματα αντικαθίστανται εβδομαδιαίως. Οι συρματινοί δακτύλιοι σταθεροποίησης αφαιρέθηκαν κατά μέσο όρο σε 12,1 εβδομάδες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Medihoney HCS Fenestrated επίθεμα επικάλυψης εφαρμόζεται σε μεταλλική δερματική επιφάνεια.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3 Δεν υπάρχουν ενδείξεις για την περριβάλλουσα μολυσματική κυτταρίτιδα μετά από εβδομαδιαίες εφαρμογή επιθεμάτων.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε πρόωρη αφαίρεση καρφίτσας ή διαδικασία χειρουργικού καθαρισμού που να σχετίζεται με τις θέσεις των pin.

Medihoney 100%

Robson V, Yorke J, Sen R, Lowe D, Rogers S. Randomised controlled feasibility trial on the use of medical grade honey following microvascular free tissue transfer to reduce the incidence of wound infection. *The British J Oral & Maxillofacial Surgery* 2012;50(4):321-327.

Biglari B., Moghaddam A, Santos K, et. al. Multicentre prospective observational study on professional wound care using honey (Medihoney). *International Wound Journal* 2012;doi:10.1111/j.1742-481X.2012.00970.x.

Milne SD, Connolly P. The influence of different dressings on the pH of the wound environment. *J Wound Care*. 2014 Feb;23(2):53-4, 56-7.

Regulski, M. A novel wound care dressing for chronic leg ulcerations. *Podiatry Management*, 2008. November/December: p. 235-246.

Bardy J, et al. A double-blind, placebo-controlled, randomized trial of active manuka honey and standard oral care for radiation induced oral mucositis. *Br J Oral Maxillofac Surg*. 2012 Apr; 50(3): 221-6.

Biswal B, et al. Topical application of honey in the management of radiation mucositis. *A Preliminary study. Support Care Cancer* (2003) 11:242-248.

Aroja, A. The use of Active Leptospermum Honey in combination with Topical Negative Pressure Wound Therapy: A clinical evaluation. Presented at Finish WoundCare Association Conference, February 2017.

Medihoney Wound Gel

Acton C, Dunwoody G. The use of medical grade honey in clinical practice. *Brit J Nurs* 2008; 17(20): S38-S44.

Acton C. Medihoney™: a complete wound bed preparation product. *Brit J Nurs* 2008; 17(11): S44-S48.

Acton C. Treatment of a venous leg ulcer found in an intravenous drug user. *Wound Essentials* 2008; 3:69-71.

Bateman S, Graham T. The use of Medihoney™ Antibacterial wound gel on surgical wounds post coronary artery bypass grafts (CABG). *Wounds UK* 2007; 3(3):76-83.

Biglari B., Moghaddam A, Santos K, et. al. Multicentre prospective observational study on professional wound care using honey (Medihoney). *Int Wound Journal*. 2012;10(3):252-259.

Cadogan J. The use of honey to treat an ulcer on the heel of a person with diabetes. *The Diabetic Foot Journal* 2008; 11(1):43-45.

Chapman L. Use of honey on a neuropathic ulcer. *Journal of Community Nursing* 2009; 23(2):10-14.

Cooper J. Wound management following orbital exenteration surgery. *Brit J Nurs* 2009; 18(6):S 4-S14.

Forbes TA, Shaw L, Quinlan C. Topical honey in the management of pediatric peritoneal dialysis exit sites. *Perit Dial Int* 2016; 36(6):684-7.

Medihoney Barrier Cream

Greenwood M, Handsaker J. Honey and Medihoney® Barrier Cream: their role in protecting and repairing skin. *Br J Community Nurs* 2012;17(12):S32-S37.

Nijhuis WA, Houwing RH, Van der Zwet WC, Jansman FG. A randomised trial of honey barrier cream versus zinc oxide ointment. *Brit J Nurs* 2012;21(20, Supp): S10-3

Johnson C. Benefits of a novel hydrogel colloidal sheet with Leptospermum honey. *Proceedings of Symposium on Advanced Wound Care Spring 2013, Denver, CO. Poster*


Shellard, S. Making a difference in quality of life with manuka honey dressing in hospice care. *New Zealand, 2012 Poster*

Wall M. Medihoney HCS provides comfort and healing for a patient with painful leg ulcers. *Proceedings of Wounds UK Nov 2014. Harrogate UK. Poster*

Medihoney Derma Cream

George NM & Cutting K F 2007. Antibacterial Honey (Medihoney®): in-vitro Activity Against Clinical Isolates of MRSA, VRE, and Other Multiresistant Gram-negative Organisms Including *Pseudomonas aeruginosa*. *J Wounds*; 19(9): 231-236

Taskapan MO & Kumar P 2000. Role of staphylococcal superantigens in atopic dermatitis: from colonisation to inflammation. *Annals of Allergy, Asthma, & Immunology*; 84(1): 3-10



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ



📍 Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 16, 18543 Πειραιάς - Αττική

☎ +30 211 4090890 📠 +30 6980 022854 📠 +30 211 4090890

🌐 www.diabetesnow.gr 🌐 together.diabetesnow.gr 📧 info@diabetesnow.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



📍 Ελληνικής Αεροπορίας 14Α, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

☎ +30 2310 805871 📠 +30 6976 946961 📠 +30 2310 383761

🌐 www.vyamedica.gr 📧 info@vyamedica.gr 📠 vyamedica

Γιατί MEDIHONEY;

Το ιατρικό μέλι της MEDIHONEY ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλα τα ιατρικά μέλια για τις ισχυρές του αντιμικροβιακές και επουλωτικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το μέλι **Active Leptospermum Honey**, γνωστό και ως μέλι Manuka, από το ομώνυμο φυτό (tea tree) που ευδοκimeί στην Νέα Ζηλανδία.

Αποτελεί επίσημα το καλύτερο ιατρικό μέλι παγκοσμίως με αναρίθμητες αναφορές και περισσότερες από 250 δημοσιευμένες μελέτες και κλινικές δοκιμές. Περιέχει μοναδικά συστατικά και ξεχωρίζει καθώς μόνο το συγκεκριμένο μέλι **μπορεί να διατηρήσει την αντιμικροβιακή του δράση και υπό την παρουσία καταλάσης προασπίζοντας έτσι την υγεία μας.**

Το μέλι της MEDIHONEY δεν περιέχει ζιζάνια, βαρέα μέταλλα, εντομοκτόνα ούτε αντιβιοτικά. Είναι φυσικό προϊόν για το οποίο παρέχεται πλήρης ιχνηλασιμότητα. Υπόκειται σε ακτινοβολία προκειμένου να αποστειρωθεί και να αφαιρεθούν οι βάκιλοι (όπως *Clostridium botulinum* spores) και επιπλέον, φιλτράρεται δέκα φορές περισσότερο σε σχέση με το βρώσιμο μέλι.

Όλα τα προϊόντα είναι υποαλλεργικά, κατάλληλα για κάθε ηλικία. Κανένα προϊόν δεν περιέχει λανολίνη, χρώμα ή άρωμα, στεροειδή, ορυκτέλαια, parabens.

